

سئوالات آزمون جذب نیروی انسانی رشته شغلی پرستاری استخدام پیمانی - اسفند ماه ۱۴۰۱

۷۱ در زمان انجام تست اتساع قفسه سینه عدم مشاهده جابجایی حرکت دستان معاینه کننده روی قفسه

سینه بیمار نشانه چیست ؟

۱ آتلکتازی

۲ همویتری

۳ آمبولی ریوی

۴ آسم

۷۲ کدامیک از موارد زیر علل ایجاد صدای استریدور Stridor است ؟

۱ احتقان و ادم مجاری هوایی

۲ اسپاسم مجاری هوایی

۳ جسم خارجی

۴ همه موارد

۷۳ همه موارد ذیل معیار ارجاع بیماران به مراکز سوختگی هست به جز:

۱ سوختگی درجه یک بیشتر از ۵ درصد کل سطح بدن در بزرگسالان

۲ سوختگی های شیمیایی

۳ صدمات ناشی از برق گرفتگی

۴ سوختگیهای نواحی صورت ، پرینه ، مفاصل

۷۴ کدامیک از موارد زیر از مشخصات هایپرپلازی خوش خیم پروستات BPH نمی باشد؟

۱ تکرر ادرار شبانه

۲ کاهش ادرار باقیمانده

۳ تاخیر در شروع ادرار

۴ تکرر ادرار

۷۵ علت کاهش ایمنی در بیماران مبتلا به لوسمی چیست ؟

۱ کاهش سلول در خون

۲ رشد بی رویه سلولها

۳ عدم بلوغ WBC

۴ افزایش تکثیر گلبول قرمز

۷۶ کدامیک از بیماران زیر بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنمی پرنیشیوز هستند ؟

۱ توتال گاسترکتومی

۲ ساب توتال گاسترکتومی

۳ کولوستومی

۴ ایلتوستومی

۷۷ بیماری که بعد از گچ گیری از درد شکایت میکند به کدام مورد باید مشکوک شد ؟

۱ فلج عضو

۲ زخم فشاری

۳ تکروز

۴ عفونت

۷۸ از علائم بارز بیماری میاستنی گراو کدام است؟

۱ لرزش دست و پا

۲ کندی حرکت در اندامها

۳ ضعف عضلانی و خستگی مفرط

۴ سفتی عضلانی اسکلتی

۷۹ اگر بیمار دیابتیک تحت تزریق انسولین از نوع NPH در ساعت ۶ صبح قرار گرفته باشد ، احتمال بروز عوارض اثر دارو در کدام ساعات خواهد بود؟

۸-۱۰ صبح

۱۰-۱۲ ظهر

۶-۱۶ بعد از ظهر

۸-۱۰ شب

۸۰ زودرس ترین نشانه افزایش فشار داخل جمجمه کدام است؟

۱ برادی کاردی

۲ خواب آلودگی

۳ تغییرات تنفس

۴ بهن شدن فشار نبض

۸۱ به منظور کاستن از مشکلات همراه با ریفلاکس معدی _ مری ، بیمار باید مصرف کدامیک از موارد ذیل را کاهش دهد؟

۱ چربی

۲ غذاهای حاوی نمک

۳ کربوهیدرات ها

۴ غذاهای سرشار از کلسیم

۸۲ بعد از برونکوسکوپی کدامیک از موارد ذیل ، نشانه شرایط شروع مصرف مایعات برای بیمار است ؟

۱ نداشتن درد در ناحیه حلق

۲ بازگشت کامل رفلکس گگ

۳ طبیعی بودن وضعیت تنفس

۴ بر حسب نیاز بیمار

۸۳ کدامیک از موارد ذیل نشان دهنده مسمومیت با دیگوکسین می باشد؟

۱ تهوع ، سردرد و اختلال دید

۲ احتباس ادراری و یبوست

۳ احتباس ادراری و یبوست

۴ هیپوتانسیون ارتواستاتیک

۸۴ در بیماران انفارکتوس میوکارد ، پوزیشن نشسته باعث افزایش کدامیک از موارد زیر می شود ؟

۱ حجم جاری تنفسی

۲ برگشت وریدی به قلب

۳ درناز لب های تحتانی ریه

۴ حجم پایان دیاستول بطنی

۸۵ کدامیک از موارد ذیل نشان دهنده مسمومیت با دیگوکسین می باشد؟

۱ تهوع ، سردرد و اختلال دید

۲ احتباس ادراری و پیوست

۳ برادیکاردی و احتباس ادراری

۴ هیپوتانسیون اور توستاتیک

۸۶ در شوک سینکرو نایز تخلیه الکتریکی در کجا انجام می شود ؟

۱ همزمان با موج S در الکتروکاردیوگرام

۲ همزمان با موج T در الکتروکاردیو گرام

۳ همزمان با موج R در الکتروکاردیو گرام

۴ همزمان با موج P در الکتروکاردیو گرام

۸۷ شایع ترین و خطرناک ترین عارضه فوری بعد از خارج کردن لوله تراشه کدام است ؟

۱ اسپاسم حنجره و پرونش

۲ تنگی تراشه

۳ فلج تارهای صوتی و آدم زیر حنجره یا گلوت

۴ اسپاسم حنجره و اسپیراسیون محتویات معده

۸۸ کدامیک از موارد ذیل نشان دهنده شکست فرایند وینینگ weaning در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه است؟

۱ نگرانی، افسردگی

۲ تعریق ، اضطراب

۳ آرام ، بی تفاوت

۴ آرام ، نگران

۸۹ در صورت بروز شوک به هنگام دیالیز صفاقی باید کدام اقدام ذیل را انجام دهد؟

۱ فوراً مایعات ورودی به شکم را افزایش دهد.

۲ نمونه خون را جهت اندازه گیری پروتئین ها به آزمایشگاه بدهد.

۳ بهتر است علائم حیاتی را کنترل کند و به پزشک خبر دهد.

۴ فوراً کلمپ خروجی را ببندد و مایعات کمتری را خارج کند.

۹۰ اولین اقدام پرستاری برای بیماری که در ضمن همودیالیز دچار آمبولی هوا شد چیست؟

۱ اکسیژن تراپی و اطلاع به پزشک در اولین فرصت

۲ احیاء قلبی ریوی در صورت نیاز و قطع همودیالیز

۳ قطع همودیالیز اکسزن تراپی بیمار به پهلو چپ، سرپائین و پاها بالا

۴ قطع همودیالیز اکسیژن تراپی خوابیده به پشت پاها بالاتر از سر

۹۱ تست بدون استرس NST به چه منظور انجام می شود؟

۱ بررسی رسیده بودن جنین

۲ بررسی رسیده بودن ریه جنین

۳ افزایش ضربان قلب جنین با فعالیت جنین

۴ توانایی جنین در برابر انقباضات رحمی و فشارهای زایمان

۹۲ پرستاری در حال مراقبت از فردی در حال زایمان است که اکسی توسین را وریدی دریافت می کند تا انقباضات رحمی تحریک شوند کدام یافته نشان می دهد که تزریق باید متوقف شود؟

۱ افزایش برون ده ادرار

۲ سرعت ضربان قلب جنین ۹۰ ضربه در دقیقه

۳ سه انقباض رخ داده در دوره ۱۰ دقیقه ای

۴ تون مناسب رحم بین انقباضات

۹۳ با اهمیت ترین هدف از زود حرکت دادن مادر پس از زایمان کدام است؟

۱ تسریع عمل روده ها

۲ جلوگیری از آتونی رحم

۳ دفع ادرار

۴ جلوگیری از ترومبوز وریدی

۹۴ مادری بدلیل تهدیه به اکلامپسی تحت درمان با سولفات منیزیوم است در مراقبت از این مادر پرستار به کدام نکته توجه دارد؟

۱ مانیتورینگ ضربان قلب

۲ کنترل رفلکس پتلا

۳ کنترل هوشیاری

۴ همه موارد

۹۵ منظور از golden time شیردهی کدام است؟

۱ نیم ساعت اول تولد

۲ سه ساعت اول تولد

۳ شش ساعت اول

۴ روز اول تولد

۹۶ حرارت مطلوب یک نوزاد طبیعی از کدام طریق اندازه گیری میشود و در کدام محدوده باید حفظ شود؟

۱ رکتال - ۳۶.۵ تا ۳۷

۲ دهانی - ۳۶.۵ تا ۳۷

۳ آگریلار - ۳۶.۵ تا ۳۷.۵

۴ دهانی - ۳۶.۵ تا ۳۷.۵

۹۷ کدامیک مهمترین نشانه کفایت شیر مادر می باشد؟

۱ افزایش وزن

۲ خواب مناسب

۳ دفع بیش از ۳ بار در روز

۴ مکیدن مکرر

۹۸ در کدامیک از موارد زیر احتمال بروز دیسترس تنفسی rds در نوزاد بیشتر است؟

۱ پارگی طولانی مدت پرده های جنینی

۲ دیابت مادر

۳ فشارخون بالای حاملگی

۴ اعتیاد مادر به مواد مخدر

۹۹ کدامیک از موارد زیر میتواند علت ایکنتر نوزاد در ۲۴ ساعت اول باشد؟

۱ ماکروزومی نوزاد

۲ تغذیه با شیر مادر

۳ ناسازگاری گروه خونی

۴ تغذیه با شیر خشک

۱۰۰ خصوصیات تکامل عاطفی از نظر اریکسون در دوره شیرخوارگی کدام است؟

۱ حسن اعتماد

۲ حس ابتکار

۳ حس خود مختاری

۴ حسن سازندگی

۱۰۱ در جریان رشد کودک در هنگامی که کالری دریافتی کودک ناکافی باشد به ترتیب کدامیک از صدک های

زیر کاهش می یابد؟

۱ دور سر وزن قد

۲ قد وزن دور سر

۳ وزن قده دور سر

۴ دور سینه وزن قد

۱۰۲ مادری شیر خوار ۴ ماهه اش را به علت گریه مداوم خم کردن رانها روی شکم به درمانگاه آورده است اگر احتمال کولیک وجود داشته باشد کدامیک از یافته های زیر با آن هماهنگ است؟

۱ کاهش وزن

۲ شکم نرم

۳ تجمع گاز در روده

۴ استفراغ های مکرر

۱۰۳ کودک هفت ساله مبتلا به شب ادراری Enuresis در بررسی پزشکی هیچ مشکل عضوی را نشان نمی دهد. بهترین توصیه پرستار به والدین کدام است؟

۱ رفتار با قاطعیت توسط والدین در صورت وقوع شب ادراری

۲ مطمئن کردن کودک به طبیعی بودن مشکل در این سن

۳ معرفی کودکان بدون مشکل به عنوان الگو

۴ پاداش دادن به کودک در قبال خشک ماندن در هر شب

۱۰۴ کدامیک از عوارض هیپوتیروئیدی درمان نشده است؟

۱ کریپتوکیدیسم

۲ کرتینیم

۳ کرنیکتروس

۴ کرون

۱۰۵ کدام تشخیص پرستاری برای انسداد روده مطرح میشود؟

۱ خطر آسپیراسیون به علت استفراغ مکرر

۲ خطر نکروز روده در ارتباط با انسداد روده

۳ خطر اختلال در مایعات و الکترولیتها در ارتباط با اسهال

۴ خطر افزایش درجه حرارت بدن در ارتباط با عفونت

۱۰۶ کدامیک از موارد زیر تظاهر همگانی در انواع فلج مغزی است؟

۱ عقب ماندگی ذهنی

۲ نقص شنوایی

۳ نابینایی

۴ تاخیر در تکامل حرکتی

۱۰۷ به کدام دلیل زیر کودک مبتلا به تترالوژی فالو در وضعیت knee chest قرار داده می شود؟

۱ کاهش مقاومت عروق سیستمیک

۲ کاهش بازگشت وریدی به قلب

۳ افزایش بازگشت وریدی به قلب و تسکین هیپوکسی

۴ کاهش انتقال خون به شریان پولمونر

۱۰۸ کودک مبتلا به هموفیلی در حین بازی در پارک زمین خورده و چار خونریزی در آرنج می شود برای به حداقل رساندن خونریزی قبل از تزریق فاکتور کدامیک از مداخلات پرستاری زیر مناسب ترین است ؟

۱ اندام را بالاتر از سطح قلب نگهدارد

۲ حداقل یک دقیقه محل صدمه را فشار دهد

۳ از کمپرس گرم جهت تسکین درد استفاده کند.

۴ اندام مبتلا را در ROM مفصل حرکت دهد.

۱۰۹ کودک خردسالی که با تشخیص ALL تحت درمان است. مداخلات پرستاری که میتواند از عوارض مربوط به نوتروپنی جلوگیری کند شامل چیست؟

۱ تشویق به مصرف غذاهای پرپروتئین و جلوگیری از خستگی کودک

۲ محدودیت ملاقات و عدم مصرف غذاهای آماده

۳ خودداری از تزریق عضلانی و کنترل درجه حرارت رکتال

۴ استفاده از مسواک نرم و شستشوی دهان با نرمال سالین

۱۱۰ کودک مبتلا به سندرم نفروتیک تحت درمان با پردنیزولون است. توصیه پرستار به والدین کدام است؟

۱ کنترل مرتب فشار خون

۲ کنترل برون ده ادراری

۳ عدم تماس با افراد مبتلا به سرماخوردگی

۴ قطع دارو در صورت بروز عوارض مثل افزایش وزن یا گرگرفتگی

۱۱۱ وظیفه اصلی خانه بهداشت کدام گزینه است؟

۱ غربالگری و درمان بیماریهای شایع

۲ ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه

۳ آموزش بهداشت و پیشگیری

۴ انجام مراقبتهای مربوط به مادران و کودکان

۱۱۲ در بین فعالیتهای اصلی PHC کدام مورد دارای اولویت بیشتری است؟

۱ واکسیناسیون

۲ بهداشت روان

۳ بهداشت محیط

۴ آموزش بهداشت

۱۱۳ هدف نهایی آموزش بهداشت عبارت است از:

۱ تغییر رفتار

۲ پیشگیری از بیماریها

۳ ارتقاء سواد سلامت

۴ درمان به موقع بیماریها

۱۱۴ در کودک HIV مثبت دارای علامت کدام واکسن منع مصرف دارد؟

۱ پنتووالان

۲ ب ث ژ

۳ MMR

۴ هپاتیت B

۱۱۵ بهترین شاخص رشد کودک عبارت است از

۱ اندازه گیری قد نسبت به سن

۲ اندازه گیری وزن نسبت به سن

۳ اندازه گیری دورسر نسبت به سن

۴ اندازه گیری دور سینه نسبت به سن

۱۱۶ کدام یک از یونهای زیر باعث سختی آب میشود

۱ کلسیم و مس

۲ سدیم و پتاسیم

۳ کلسیم و منیزیم

۴ منگنر و سرب

۱۱۷ متداول ترین روش تعیین درجه آلودگی فاضلاب شهری کدام گزینه است؟

۱ تعیین BOD

۲ تعیین COD

۳ تعیین TOC

۴ تعیین SS

۱۱۸ استراتژی درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم در خصوص کدام بیماری به کار می رود؟

۱ آلودگی به HIV

۲ هپاتیت ها

۳ وبا

۴ توبرکلوزیس

۱۱۹ مهم ترین جزء برنامه بهداشت مدارس کدام مورد است؟

۱ تدابیر درمانی و پیشگیری

۲ آموزش بهداشت

۳ ارزیابی وضعیت سلامت دانش آموزان

۴ سالم سازی محیط مدرسه

۱۲۰ کدام اصطلاح در مورد ابتلا به موارد قدیم و جدید یک بیماری به کار می رود؟

۱ پره والانس

۲ انسیداس

۳ ویرولانس

۴ سورویلانس

۱۲۱ کمال طلبی و انعطاف ناپذیری ویژگی اصلی کدام اختلال شخصیت است؟

۱ خودشیفته

۲ نمایشی

۳ وسواسی جبری

۴ ضد اجتماعی

۱۲۲ کدام نوع فعالیت به بیمار مبتلا به مانیک توصیه می شود؟

۱ فردی

۲ رقابتی

۳ جمعی

۴ سازماندهی نشده

۱۲۳ ترس یا اضطراب نسبت به یک یا چند موقعیت اجتماعی که فرد نگران حضور افراد دیگر است. عبارت است از:

۱ آگورا فوبیا

۲ اختلال اضطراب جدایی

۳ فوبی خاص

۴ فوبی اجتماعی

۱۲۴ حساسیت نسبت به طرد شدن از جانب دیگران چه نوع اختلال شخصیتی محسوب می شود

۱ اختلال شخصیت دوری‌گزين

۲ اختلال شخصیت وابسته

۳ اختلال شخصیت نمایشی

۴ اختلال شخصیت اسکیزوئید